

ဆေးအမည် - မက်ဂါဖန်ဇီ

အစွမ်းရှိပစ္စည်း(a.i) - Azoxystrobin 25% + Difenoconazole 15% WDG

ဆေးအာနိသင်

- မှိုရောဂါအများစုအတွက် ထိရောက်သော ကာကွယ်ကုသဆေးဖြစ်သည်။
- ဆေးသည် ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိပြီး မှိုစပိုးမျိုးညှောင့်ပေါက်မှုကို တားဆီးဟန့်တားပေးနိုင်သည့်အတွက် ရောဂါကျရောက်မှုမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
- ထို့အပြင် မှိုမျှင်ကြီးထွားပွားများမှုကိုပါ ရပ်တန့်ပေးသည့်အတွက် ရောဂါပြန့်ပွားမှုကို ကုသနှိမ်နင်းပေးနိုင်ပါသည်။
- ဆေးဖျန်းလိုက်သည်နှင့် မြန်မြန်ထိုးဖောက်စိမ့်ဝင်ပြီး အပင်ရေကြောစည်းမှတစ်ဆင့် တစ်ပင်လုံးသို့ ပျံ့နှံ့စေပါသည်။
- သီးနှံပင်ပေါ်တွင် ဆေးအာနိသင်ကြာရှည်ခံသည့်အတွက် ရောဂါများကို အချိန်ကြာရှည်စွာ ကာကွယ်ကုသပေးနိုင်ပါသည်။
- ဆေးသည် ရောဂါကို ကာကွယ်ကုသပေးသည့်အပြင် သီးနှံအရည်အသွေးကို ကောင်းစေပြီး အထွက်နှုန်းကိုပါ တိုးစေပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

- သီးနှံရောဂါများကို ကြာရှည်စွာ ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်ကုသပေးသည့်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေပါသည်။
- ဆေး(၂) မျိုးစပ်ဖြစ်သည့်အတွက် ဆေးယဉ်ပါးမှုကိုလည်း လျော့ချပေးပါသည်။
- အခြားမှိုသတ်ဆေးများနှင့် ရောသုံးနိုင်ပြီး မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေး (သို့) မြေပြင်ဖျန်းဆေးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- သီးနှံအစာချက်လုပ်မှုအားကို ပိုကောင်းစေပြီးတော့ သီးနှံပင်ကို ရောဂါကျရောက်မှုမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။

အသုံးပြုနိုင်သည့်သီးနှံများ	နှိမ်နင်းနိုင်သည့် ရောဂါဖျက်ပိုးများ
စပါး	ရွက်ဖုံးခြောက်၊ ဂုတ်ကျိုး၊ ရွက်ညိုပြောက်၊ ရွက်ညိုပြောက်ရှည်
မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း	ဖားဥမှို၊ သံချေး၊ မှဲ့ပြောက်စွန်း၊ စာကိုစပိုးရားရွက်ပြောက်
ခရမ်းချဉ်၊ အာလူး	စောပင်နာကျ၊ အာလူးချေးဖတ်
ပြောင်း	မြောက်ပိုင်းပြောင်းရွက်ခြောက်၊ တောင်ပိုင်းပြောင်းရွက်ခြောက်၊ ရွက်ခြောက်ရောဂါ
ငရုတ်	မှဲ့ပြောက်စွန်း/အသီးပုပ်/ကိုင်းဖျားခြောက်၊ ဖားဥမှို
စပျစ်	ဖားဥမှို၊ ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်၊ မှဲ့ပြောက်စွန်း
ဘူး၊ ဖရုံ၊ သခွား၊ ဖရဲ	ဖားဥမှို၊ မှဲ့ပြောက်စွန်း၊ ထောင့်ကွက်ရွက်ပြောက်

ကြက်သွန်နီ/ဖြူ	တောက်တဲ့မြီး၊ လည်လိမ်/ဂျိုလိမ်၊ ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်
ဂန္ဓမာ	သံချေးဖြူရောဂါ
မြေပဲ၊ နှမ်း	စောရွက်ပြောက်၊ နှောင်းရွက်ပြောက်၊ သံချေး၊ အော်တာနေရီးယားရွက်ပြောက်
ဝါ	ဝါထောင့်ကွက်လက်မည်းရောဂါ

သတိပြုရန်

- ရောဂါကျရောက်မှုများနေပါက အားဆေးများနှင့် တွဲမသုံးပါနှင့်။
- ဆေးသည် အပင်အောက်ဖက်မှ အထက်သို့ ပျံ့နှံ့စေသောကြောင့် အပင်ခြေသို့ ရွှဲရုံဖြန်းပေးသင့်ပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သည့် ရောဂါဖျက်ပိုးများ	နှုန်းထား/ ရေ (၁၆) လီတာ	အသုံးပြုပုံ
စပါး	ရွက်ဖုံးခြောက်၊	၁၀ - ၃၀	ဖျန်းဆေးအနေဖြင့်အသုံးပြုရန်
ကြက်သွန်နီ/ဖြူ	တောက်တဲ့မြီး၊ လည်လိမ်/ဂျိုလိမ်၊ ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်	၁၀ - ၃၀	ဖျန်းဆေးအနေဖြင့်အသုံးပြုရန်
ခရမ်းချဉ်၊ အာလူး	စောပင်နာကျ၊ အာလူးချေးဖတ်	၁၀ - ၃၀	ဖျန်းဆေးအနေဖြင့်အသုံးပြုရန်
စပျစ်	ဖားဥမှို၊ ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်၊ မဲ့ပြောက်စွန်း	၁၀ - ၃၀	ဖျန်းဆေးအနေဖြင့်အသုံးပြုရန်
ဂန္ဓမာ	သံချေးဖြူ	၁၀ - ၃၀	ဖျန်းဆေးအနေဖြင့်အသုံးပြုရန်

Name – Mega Fenzo

Active Ingrdient – Azoxystrobin 25% + Difenoconazole 15% WDG

Product Feature

- It is effective and broad-spectrum fungicide with protective and curative action.
- It is a dual systemic fungicide which inhibits spore germination at the early stage of fungal development. Thus, it protects the crop against invasion by fungal pathogens.
- It is also a sterol demethylation inhibitor which prevents the development of the fungus by inhibiting cell membrane ergosterol biosynthesis.
- It rapid uptake with translaminar and xylem-systemic movement and multisite action.
- Dual mode of action, hence effective and provides longer duration control on diseases.
- It offers not only disease control but also improves crop health, quality and yield of a crop.

Advantage

- It is highly effective fungicide with long-lasting effect against fungal infestation.
- It is an excellent tool for resistance management.
- It is used with other fungicides and also used as a seed-treatment or soil-treatment.
- It enhances more photosynthesis and healthy crop.

Applicable Crops	Target Pests
Paddy	Sheath blight, Blast, Brown Spot, Narrow Brown Spot
Blackgram, Mungbean	Powdery mildew, Rust, Anthracnose, Cercospora leaf spot
Tomato, Potato	Early blight, Potato scab
Maize	Northern leaf blight, Southern leaf blight, Banded leaf and sheath blight
Chilli & Pepper	Anthracnose/Fruit rot and die-back, Powdery mildew
Grape	Powdery mildew, Downy mildew
Cucurbit, Pumpkin, Cucumber, Watermelon	Powdery mildew, Anthracnose, Angular leaf spot
Onion & Garlic	Purple Blotch, Anthracnose, Downy mildew
Chrysanthemum	White Rust
Peanut, Sesame	Early leaf spot, Late leaf spot, Rust, Alternaria leaf spot
Cotton	Angular leaf spot

Cautions

- Don't use with foliar fertilizer when the disease is severe.
- Since it is acropetal movement in plant system, it should be sprayed thoroughly at the basal part of the plant.

Uses and Recommendations

Crop	Target Pests	Dosage/ (16) Lit	Method
Paddy	Sheath Blight, Blast, Brown Spot, Narrow Brown Spot	10-30	Spray
Onion & Garlic	Purple Blotch, Anthracnose, Downy mildew	10-30	Spray
Tomato, Potato	Early blight, Potato scab	10-30	Spray
Grape	Powdery mildew, Downy mildew, Anthracnose	10-30	Spray
Chrysanthemum	White rust	10-30	Spray