

ဆေးအမည် - မက်ဂါပိုဇီ

အစွမ်းရှိပစ္စည်း(a.i) - Kresoxim-methyl 25% + Epoxiconazole 5% SC

ဆေးအာနိသင်

- မက်ဂါပိုဇီမိုသတ်ဆေးသည် စထရိုဘီလူရင်နှင့် ထရိုင်ဖိုးအုပ်စုဝင် မိုသတ်ဆေးနှစ်မျိုးကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး ရောဂါများစွာကို နှိမ်နင်းပေးနိုင်သည့် မိုသတ်ဆေးဖြစ်ပါသည်။
- ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိပြီး ကာကွယ်ကုသအမြစ်ပြတ်သုတ်သင်နိုင်သည့် မိုသတ်ဆေးဖြစ်ပါသည်။ အပင်အတွင်းထိုးဖောက်စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းလည်း ရှိပါသည်။
- မှိုမျှင်ကြီးထွားမှု၊ မှိုမျိုးညှောင့်ပေါက်မှုနှင့် မှိုဆဲလ်နံရံထူထဲမှုများကို ဟန့်တားပေးခြင်းဖြင့် ရောဂါဖြစ်စေသည့် မှိုများကို ကာကွယ်နှိမ်နင်းပေးပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

- ဆေးအာနိသင်ကြာရှည်ခံပြီး မိုးရေဒဏ်ကိုပါ ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။
- မှိုရောဂါများစွာကို နှိမ်နင်းပေးနိုင်သည့်အပြင် ဖားဥမှိုရောဂါကို အထူးကာကွယ်နှိမ်နင်းပေးနိုင်ပါသည်။
- သီးနှံပင် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် အစာချက်လုပ်မှုများကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပြီး အရွက်များ အချိန်မတိုင်မီ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို နှောင့်နှေးစေပါသည်။
- ဆေးအုပ်စုဝင်မတူသည့် ဆေးနှစ်မျိုးကို ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် ဆေးယဉ်ပါးမှုပြဿနာကို လျော့ချပေးနိုင်ပါသည်။

အသုံးပြုနိုင်သည့်သီးနှံများ	နှိမ်နင်းနိုင်သည့် ရောဂါဖျက်ပိုးများ
စပါး	ရွက်ဖုံးခြောက်၊ ဂုတ်ကျိုး၊ ရွက်ညိုပြောက်၊ ရွက်ညိုပြောက်ရှည်
ပြောင်း	မြောက်ပိုင်းပြောင်းရွက်ခြောက်၊ သံချေး၊ တောင်ပိုင်းပြောင်းရွက်ခြောက်၊ ရွက်ခြောက်ရောဂါ
မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း	ဖားဥမှို၊ သံချေး၊ မှဲ့ပြောက်စွန်း၊ စာကိုစပိုးရားရွက်ပြောက်
မြေပဲ၊ နှမ်း	စောရွက်ပြောက်၊ နှောင်းရွက်ပြောက်၊ သံချေး၊ စာကိုစပိုးရားရွက်ပြောက်၊ အော်တာနေရီးယားရွက်ပြောက်
ခရမ်းချဉ်၊ အာလူး	စောပင်နာကျ၊ နှောင်းပင်နာကျ၊ အာလူးချေးဖတ်
ကြက်သွန်နီ/ဖြူ	တောက်တဲ့မြီး၊ လည်လိမ်/ဂျိုလိမ်၊ ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်
ငရုတ်	မှဲ့ပြောက်စွန်း/အသီးပုပ်/ကိုင်းဖျားခြောက်၊ ဖားဥမှို
ဘူး၊ ဖရုံ၊ သခွား၊ ဖရဲ	ဖားဥမှို၊ ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်၊ မှဲ့ပြောက်စွန်း
မုန်ညင်း၊ မုန်လာမျိုးနွယ်ဝင်အပင်များ	ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်၊ သံချေးဖြူ၊ အော်တာနေရီးယားရွက်ပြောက်(ဒေါင်းမြီးကွက်ရောဂါ)
စပျစ်	ဖားဥမှို၊ ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်၊ မှဲ့ပြောက်စွန်း၊ မီးခိုးမှိုရောဂါ
ငှက်ပျော	စိကာတိုကာရောဂါ၊ မှဲ့ပြောက်စွန်း
ပန်းသီး၊ သစ်တော်သီး	ကြေးဖတ်၊ ဖားဥမှို
ဂနွေမာ	သံချေးဖြူ

သတိပြုရန်

- အေး၍ခြောက်သွေ့သောနေရာ၊ နေရောင်နှင့်တိုက်ရိုက်မထိတွေ့သော နေရာ၊ ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းရန်။
- မက်ဂါပိုဒီမိုသတ်ဆေးသည် အထက်သို့ ပျံ့နှံ့သည့်မိုသတ်ဆေးဖြစ်သည့်အတွက် တစ်ပင်လုံးဆေးပျံ့နှံ့စေရန် အပင်အောက်ခြေမှ ဆေးစဖျန်းသင့်ပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သည့် ရောဂါဖျက်ပိုးများ	နှုန်းထား/ ရေ (၁၆) လီတာ	အသုံးပြုပုံ
စပါး	ရွက်ဖုံးခြောက်၊ ဂုတ်ကျိုး၊ ရွက်ညိုပြောက်၊ ရွက်ညိုပြောက်ရှည်	၁၀ - ၂၀	ဖျန်းဆေးအနေဖြင့်အသုံးပြုရန်
မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း	ဖားဥမှို၊ သံချေး၊ မှဲ့ပြောက်စွန်း၊ စာကိုစပိုးရားရွက်ပြောက်	၁၀ - ၂၀	ဖျန်းဆေးအနေဖြင့်အသုံးပြုရန်
ခရမ်းချဉ်၊ အာလူး	စောပင်နာကျ၊ နှောင်းပင်နာကျ၊ အာလူးချေးဖတ်	၁၀ - ၂၀	ဖျန်းဆေးအနေဖြင့်အသုံးပြုရန်
စပျစ်	ဖားဥမှို၊ ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်၊ မှဲ့ပြောက်စွန်း၊ မီးခိုးမှိုရောဂါ	၁၀ - ၂၀	ဖျန်းဆေးအနေဖြင့်အသုံးပြုရန်
ဂနွေမာ	သံချေးဖြူ	၁၀ - ၂၀	ဖျန်းဆေးအနေဖြင့်အသုံးပြုရန်

Name – Mega Poxi

Active Ingrdient – Kresoxim-methyl 25% + Epoxiconazole 5% SC

Feature

- It is a broad-spectrum fungicide, with combination two group of fungicides triazole and strobilurin.
- It is a systemic fungicide and has preventive, curative, eradicator activity and translaminar effect.
- The mode of action of this fungicide is preventing the mycelial growth, sporulation and inhibiting the fungal cell integrity.

Advantages

- It has good residual effect and also resistant to rain wash.
- As a broad-spectrum, it can control widely disease especially against in powdery mildew.
- The growth, development, and photosynthesis of crops can be enhanced, while premature leaf senescence is also delayed.
- Different mode of action helps in decreasing the development of resistance in target fungi.

Applicable Crops	Target Pests
Paddy	Sheath blight, Blast, Brown Spot, Narrow Brown Spot
Maize	Northern leaf blight, Southern leaf blight, Rust, Banded leaf and sheath blight
Blackgram, Mungbean	Powdery mildew, Rust, Anthracnose, Cercospora leaf spot
Peanut, Sesame	Early leaf spot, Late leaf spot, Rust, Cercospora leaf spot, Alternaria leaf spot
Tomato, Potato	Early blight, Late blight, Potato scab
Chilli & Pepper	Anthracnose/Fruit rot and die-back, Powdery mildew
Onion & Garlic	Purple Blotch, Anthracnose, Downy mildew
Cucurbit, Pumpkin, Cucumber, Watermelon	Powdery mildew, Downy mildew, Anthracnose
Brassicae crops	Downy mildew, White rust, Alternaria leaf spot
Grape	Powdery mildew, Downy mildew, Botrytis bunch rot
Banana	Yellow sigatoka, Black sigatoka, Anthracnose
Apple, Pear	Scab, Powdery mildew
Chrysanthemum	White Rust

Cautions

- It should be stored in a cool, dry place, away from sunlight and out of reach of children.
- To ensure the fungicide disperses throughout the plant, thorough spraying on the basal part is necessary, as it moves acropetally (upward) within the plant.

Uses and Recommendations

Crop	Target Pests	Dosage/ (16) Lit	Method
Paddy	Sheath Blight, Blast, Brown Spot, Narrow Brown Spot	10-20	Spray
Blackgram, Mungbean	Powdery mildew, Rust, Anthracnose, Cercospora leaf spot	10-20	Spray
Tomato, Potato	Early blight, Late blight, Potato scab	10-20	Spray
Grape	Powdery mildew, Downy mildew, Botrytis bunch rot	10-20	Spray
Chrysanthemum	White rust	10-20	Spray