

ဆေးအမည် - မက်ဂါဆာလ်ဖာ

အစွမ်းရှိပစ္စည်း(a.i) - Sulphur 80% WDG

ဆေးအာနိသင်

- မှိုသတ်ဆေး၊ အနည်းလိုအာဟာရနှင့် မွှားပင့်ကူသတ်ဆေးအဖြစ် အမျိုးမျိုး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- အမျိုးမျိုးသောရောဂါများအတွက် ထိသေအာနိသင်ရှိ ကာကွယ်ဆေးဖြစ်သည်။
- မှိုမျှင်ကြီးထွားမှု၊ မှိုစပိုင်းမျိုးညှောင့်ပေါက်မှုနှင့် အပင်၏ အပေါ်ယံမျက်နှာပြင်ကို မာကျောစေတဲ့အတွက် မှိုစပိုင်းများ အပင်မျက်နှာပြင်အတွင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုကိုပါ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
- မွှားပင့်ကူ၏ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များကို နှောင့်ယှက်ဟန့်တားပေးသည့်အတွက် မွှားများခြောက်၍ သေစေပါသည်။
- အာနိသင်ကြာရှည်ခံပြီး သီးနှံမျိုးစုံတွင် ကျရောက်တတ်သော ဖားဥမှိုရောဂါကို အထူးကာကွယ်နှိမ်နင်းနိုင်သည်။
- အနည်းလိုအာဟာရဖြစ်သည့်အတွက် ပဲမျိုးနွယ်ဝင်အပင်များတွင် ပဲမြစ်ဖုဖြစ်ပေါ်မှုကို အားပေးရုံသာမက ကြက်သွန်နီ/ဖြူ၊ မုန်ညင်းများ၏ အနံ့ကို ပိုမိုကောင်းစေပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

- အမျိုးမျိုးသော ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များကို နှောင့်ယှက်ဟန့်တားပေးသည့်အတွက် ဖျက်ပိုးရောဂါများဆိုးရွားနိုင်မှုကို လျော့ချပေးနိုင်ပါသည်။
- သီးနှံပင်၏ ပရိုတင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့် ကလိုရိုဖီးလ်ဖြစ်ပေါ်မှုအတွက် အရေးပါလှသော အာဟာရဓာတ်လည်း ဖြစ်သည်။
- ပိုးမွှားရောဂါများကို ဆေးတစ်မျိုးတည်းဖြင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းပေးနိုင်သည့်အတွက် အခြားဆေးများအား အသုံးပြုမှုကို လျော့ချပေးနိုင်ပါသည်။

သတိပြုရန်

- ရာသီဥတုပြောင်းပါက သီးနှံပင်ကို လောင်တတ်သည့်အတွက် နံနက်စောစောနှင့် ညနေနေစောင်းချိန်များတွင် အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
- အယ်ကာလီ ပါဝင်သောဆေးများနှင့် ရော၍ အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ရှားသင့်ပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သည့်ရောဂါများ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
စပျစ်၊ သရက်၊ ပဲမျိုးစုံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အလှူစိုက်ပန်းပင်များ	ဖားဥဋ္ဌိ၊ သံချေး၊ အသီးပုပ်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၄၀-၅၀) ဂရမ်	ကြိုတင်ကာကွယ်၍သော်လည်းကောင်း၊ ရောဂါလက္ခဏာအစပြုချိန်တွင်သော်လည်းကောင်း အသုံးပြုရန်

Name - Mega Sulphur

a.i - Sulphur 80% WDG

Product Feature

- It has triple action as fungicide, micronutrient (Sulphur) and miticide.
- It is a broad spectrum contact and protective fungicide.
- It inhibits fungal growth, spore germination and fungal colonization by hardening the plant surface.
- For mites, it interferes with their metabolic processes, leading to desiccation or disruption of normal biological functions.
- It has long-lasting effect and is effective against powdery mildew in various crop.
- As it is also micronutrient, it not only encourages the formation of nodules in fabaceae but also improves the smell of onion, garlic and mustard.

Advantages

- It has multi-site mode of action, reducing the risk of pathogen resistance.
- It is a vital nutrient for plants, playing a role in protein synthesis and chlorophyll formation.
- It provides both disease and pest control in one product, reducing the multiple applications.

Precaution

- It should be applied during early morning or late evening to avoid phytotoxicity due to high temperatures.
- It should be avoided mixing with alkaline substances like Bordeaux mixture or other incompatible chemicals.

Uses and Recommendations

Crops	Target pests	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Grapes, Mangoes, Legumes, Vegetables, Ornamentals	Powdery mildew, Rust, Brown rot	(40-50) g per (16) L of water	Apply as preventive or at the initial stage of the disease