

ဆေးအမည် - ရွှေဆိုင်မော

အစွမ်းရှိပစ္စည်း(a.i) - Cymoxanil 30% WP

ဆေးအာနိသင်

- ထိသေနှင့် ပင်လုံးပျံ့အာနိသင်ရှိ မှိုသတ်ဆေးဖြစ်သည်။
- ဆေးအာနိသင် ထိုးဖောက်စိမ့်ဝင်မှုအားကောင်းပြီး ရောဂါများကို ကာကွယ်၊ ကုသနိုင်စွမ်းရှိသော ဆေးဖြစ်သည်။
- မှိုစပိုးမျိုးညှောင့်ပေါက်မှု၊ မှိုရောဂါကြီးထွားမှု၊ မှိုမျှင်ဖြစ်ပေါ်မှုနှင့် အပင်ဆဲလ်အတွင်း မှိုမျှင်၏ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုတို့ကို ဟန့်တားပေးနိုင်သော ဆေးစွမ်းကောင်းဖြစ်သည်။
- ရေတွင် ကောင်းစွာပျော်ဝင်နိုင်ပါသည်။
- ဆေးသည် (၁၂-၄၈) နာရီအတွင်း ရောဂါပျံ့နှံ့မှုကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး ရောဂါများကို ထိထိရောက်ရောက် ကုသနိုင်ပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

- ရောဂါများကို အချိန်တိုအတွင်း ကာကွယ်နှိမ်နင်းပေးနိုင်သည့်အတွက် သီးနှံအထွက်နှုန်းနှင့် အရည်အသွေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။
- နှောင်းပင်နာကျ/လောင်ရောဂါ၊ ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်၊ ခါးရို၊ ဒဂီးကွက်ရောဂါများကဲ့သို့ အခြားဆေးများနှင့် နှိမ်နင်းရခက်သည့် ရောဂါများကို ထိထိရောက်ရောက် အထူးနှိမ်နင်းပေးနိုင်ပါသည်။
- ရွှေဆန်းကို (သို့) မက်ဂါမန်ကိုဇက် ဆေးနှင့် ရောသုံးပါက အာနိသင်ကို ပိုမိုထိရောက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။

သတိပြုရန်

- ဆေးဖျန်းသည့်အခါတွင် ရောဂါကျရောက်သည့် နေရာများအထိရောက်အောင် သေချာဖျန်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
- နှုန်းထားများပိုသုံးခြင်းသည် သီးနှံပင်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး နှုန်းထားလျှော့သုံးပါကလည်း ရောဂါအား ထိရောက်မှုနည်းကာ ဆေးအား ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို ဖြစ်စေပါသည်။ ဒါကြောင့် သုံးစွဲရန်အညွှန်းပါ နှုန်းထားအတိုင်း အသုံးပြုသင့်ပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သည့်ရောဂါများ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
--------	-----------------------------	--------------	------------------------------------

ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ -အာလူး၊ ခရမ်းချဉ်၊ ငရုတ်၊ ကြက်သွန်၊ မုန်ညင်းမုန်လာများ၊ ဗူး၊ဖရုံ၊ သခွားအုပ်စုဝင်သီးနှံ များ	နှောင်းပင်နာကျ/လော င်၊ စောပင်နာကျ၊ တောက်တဲ့မြီး၊ ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်၊ ခါးရို၊ သံချေးဖြူ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၂၀-၄၀) ဂရမ်	ကြိုတင်ကာကွယ်၍သော်လ ည်းကောင်းရောဂါအစောပိုင်း အဆင့်တွင် အသုံးပြုရန်လည်းကောင်း
စပျစ်	ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်၊ ဖားဥမှို၊ မဲ့စွန်း/ညှာညို	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၂၀-၄၀) ဂရမ်	ကြိုတင်ကာကွယ်၍သော်လ ည်းကောင်းရောဂါအစောပိုင်း အဆင့်တွင် အသုံးပြုရန်လည်းကောင်း
ဂနွေမာ	သံချေးဖြူ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၂၀-၄၀) ဂရမ်	ကြိုတင်ကာကွယ်၍သော်လ ည်းကောင်းရောဂါအစောပိုင်း အဆင့်တွင် အသုံးပြုရန်လည်းကောင်း
ကွမ်း	ဒေါင်းမြီးကွက်/ဒဂီးကွ က်၊ ပင်ခြေပုပ်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၂၀-၄၀) ဂရမ်	ကြိုတင်ကာကွယ်၍သော်လ ည်းကောင်းရောဂါအစောပိုင်း အဆင့်တွင် အသုံးပြုရန်လည်းကောင်း

Name - Shwe Cymox

a.i - Cymoxanil 30% WP

Product Feature

- It is contact and locally systemic fungicide with a unique mode of action.
- It has excellent penetrative properties and can move into plant tissues with protective and curative properties.
- It inhibits spore germination, fungal development, hyphal formation and penetration.
- It is highly soluble in water.

- It stops the fungal development at an early stage and typically prevents the spread of the disease within 24-48 hours.

Advantages

- It can quickly prevent and control the diseases, so it can improve the yield and quality of crop.
- It is strongly effective against the oomycete diseases like late blight, downy mildew, damping off, phytophthora leaf spot etc.
- It is more effective against the diseases when used with Shwe Sunco or Mega Mancozeb.

Precaution

- ဆေးဖျန်းသည့်အခါတွင် ရောဂါကျရောက်သည့် နေရာများအထိရောက်အောင် သေချာဖျန်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
- နှုန်းထားများများပိုသုံးခြင်းသည် သီးနှံပင်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး နှုန်းထားလျှော့သုံးပါကလည်း ရောဂါအား ထိရောက်မှုနည်းကာ ဆေးအား ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို ဖြစ်စေပါသည်။ ဒါကြောင့် သုံးစွဲရန်အညွှန်းပါ နှုန်းထားအတိုင်း အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
- When spraying, it is necessary to make sure to reach the diseased area.
- Overusing can lead to phytotoxicity (crop damage) and under-dosing may result in ineffective disease control and contribute to fungal resistance. Therefore, it is important to use the recommended rate.

Uses and Recommendations

Crops	Target Pests	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Vegetables: Potatoes, Tomatoes, Chilli & Pepper, Onion & Garlic, Brassica crops, Cucurbits	Late blight, Early blight, Purple blotch, Downy mildew, Damping-off, White rust	(20 – 40) g per (16) L of water	Apply preventively or at the initial stage of the disease
Fruits: Grapes	Downy mildew, Powdery mildew, Anthracnose	(20 – 40) g per (16) L of water	Apply preventively or at the initial stage of the disease

Chrysanthemum	White rust	(20 – 40) g per (16) L of water	Apply preventively or at the initial stage of the disease
Betel vine	Phytophthora leaf spot, Phytophthora foot rot	(20 – 40) g per (16) L of water	Apply preventively or at the initial stage of the disease