

ဆေးအမည်

- မက်ဂါနာရာ

အစွမ်းရှိပစ္စည်း(a.i)

- Kasugamycin 2% WP

ဆေးအာနိသင်

- ပဋိဇီဝဆေးအုပ်စုဝင် မှိုနှင့် ဘက်တီးရီးယား ကာကွယ်ကုသဆေးဖြစ်သည်။
- ပင်လုံးပြန့်၊ ထိုးဖောက်စိမ့်ဝင်အာနိသင်ရှိပြီး သီးနှံပင်တွင် အာနိသင် ကြာရှည်ခံသည်။
- မှိုနှင့် ဘက်တီးရီးယားများ၏ ပရိုတင်းထုတ်လုပ်မှုကို နှောင့်ယှက်ဟန့်တားပေးခြင်းအားဖြင့် ကြီးထွားမှု၊ ပွားများမှုများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
- ဘက်တီးရီးယားရောဂါများနှင့် အချို့သော မှိုရောဂါများကို ကာကွယ်ကုသပေးနိုင်သော ဆေးစွမ်းကောင်းဖြစ်သည်။
- အခြားသောမှိုသတ်ဆေး/ ပိုးသတ်ဆေး/ မြေဩဇာများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

- ဆေးသည် အချိန်တိုအတွင်း ရောဂါများကို နှိမ်နင်းပေးနိုင်သည်။
- ဆေးတစ်မျိုးတည်းဖြင့် ရောဂါများစွာကို နှိမ်နင်းပေးနိုင်သည့်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေပြီး သီးနှံအထွက်နှုန်းကို တိုးစေပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သည့်ရောဂါများ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
စပါး	ဘက်တီးရီးယားရွက်ခြောက်၊ ဘက်တီးရီးယားရွက်စင်း၊ ရွက်ဖုံးခြောက်၊ ဂုတ်ကျိုး	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၃၀-၅၀) ဂရမ်	ကြိုတင်ကာကွယ်၍သော်လည်း ကောင်း ရောဂါလက္ခဏာ အစပြုချိန်တွင် လည်းကောင်း အသုံးပြုရန်
ပဲမျိုးစုံ	ဘက်တီးရီးယားရွက်ခြောက်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၃၀-၅၀) ဂရမ်	ကြိုတင်ကာကွယ်၍သော်လည်း ကောင်း ရောဂါလက္ခဏာ အစပြုချိန်တွင် လည်းကောင်း အသုံးပြုရန်
ဟင်းသီးဟင်းရွက် များ- ခရမ်းချဉ်၊ ငရုတ်၊ ခရမ်း၊ ကြက်သွန်နီ/ဖြူ၊ မုန်ညင်းမုန်လာပင် များ၊ ဗူး၊ ဖရုံ၊ သခွားအုပ်စုဝင် များ	ဘက်တီးရီးယားရွက်ပြောက်၊ ဘက်တီးရီးယားပင်ညှိုး၊ ဘက်တီးရီးယားကင်ကာ၊ ဘက်တီးရီးယားပျော့ပုပ်၊ ဘက်တီးရီးယားရွက်ခြောက်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၃၀-၅၀) ဂရမ်	ကြိုတင်ကာကွယ်၍သော်လည်း ကောင်း ရောဂါလက္ခဏာ အစပြုချိန်တွင် လည်းကောင်း အသုံးပြုရန်

ဝါ	ထောင့်ကွက်လက်မည်းရောဂါ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၃၀-၅၀) ဂရမ်	ကြိုတင်ကာကွယ်၍သော်လည်းကောင်း ရောဂါလက္ခဏာအစပြုချိန်တွင် လည်းကောင်း အသုံးပြုရန်
ကွမ်းရွက်	ဆီစွန်းရောဂါ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၃၀-၅၀) ဂရမ်	ကြိုတင်ကာကွယ်၍သော်လည်းကောင်း ရောဂါလက္ခဏာအစပြုချိန်တွင် လည်းကောင်း အသုံးပြုရန်

Name - Mega Nara

a.i - Kasugamycin 2% WP

Product Feature

- It is an antibiotic protective and curative fungicide and bactericide.
- It has strong systemic activity, penetrability and long-lasting effect.
- It prevents the growth and reproduction of hyphae or bacteria by inhibiting the protein synthesis.
- It is effective against a wide range of bacterial diseases and some fungal diseases.
- It can be used with other pesticides or fertilizers.

Advantages

- It rapidly control pathogen activity, showing visible results in a short time.
- It can prevent and control many diseases with just one, thus reducing costs and increasing crop yields.

Uses and Recommendations

Crops	Target pests	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Paddy	Bacterial leaf blight, Bacterial leaf streak, Sheath blight, Blast	(30 – 50) g per (16) L of water	Apply preventively or at the initial stage of the disease

Legumes	Common blight, Bacterial leaf blight	(30 – 50) g per (16) L of water	Apply preventively or at the initial stage of the disease
Vegetables: Tomato, Chili & Pepper, Eggplant, Onion & Garlic, Brassica crops, Cucurbits	Bacterial spot, Bacterial speck, Bacterial wilt, Bacterial canker, Bacterial soft rot, Black rot, angular leaf spot	(30 – 50) g per (16) L of water	Apply preventively or at the initial stage of the disease
Cotton	Angular leaf spot	(30 – 50) g per (16) L of water	Apply preventively or at the initial stage of the disease
Betel vine	Bacterial leaf spot	(30 – 50) g per (16) L of water	Apply preventively or at the initial stage of the disease