

ဆေးအမည် - ရွှေခရီး

အစွမ်းရှိပစ္စည်း(a.i) - Kresoxim-methyl 50% WG

ဆေးအာနိသင်

- မှိုရောဂါတော်တော်များများအတွက် အသုံးပြုနိုင်သော ပင်လုံးပြန့်ပွားမှုသတ်ဆေးဖြစ်သည်။
- ကာကွယ်၊ ကုသ၊ အမြစ်ပြတ်သုတ်သင်နိုင်ပြီး အာနိသင်ကြာရှည်ခံသည့်ဆေးဖြစ်သည်။
- မှိုမျှင်ကြီးထွားမှု၊ မှိုစပိုင်းထုတ်မှုနှင့် မှိုစပိုင်းမျိုးညှောင့်ပေါက်မှုတို့ကို ဟန့်တားပေးနိုင်သည်။
- အထူးသဖြင့် ဖားဥမှိုရောဂါကို ကာကွယ်နှိမ်နင်းနိုင်သောဆေးဖြစ်သည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

- အပင်၏အစာချက်လုပ်မှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်းအားဖြင့် အရွက်အရောင်ကို စိမ်းစိုလှပစေပြီး သီးနှံပင်ကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေပါသည်။
- ဆေးနှုန်းထားအနည်းငယ် သုံးရုံဖြင့် ထိရောက်မှုရှိသည့်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေပါသည်။
- သီးနှံပင်တွင် အာနိသင်ကြာရှည်ခံသည့်အတွက် ဆေးကို အကြိမ်ကြိမ် အသုံးပြုစရာမလိုပါ။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သည့်ရောဂါများ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
စပါး	ဂုတ်ကျိုး၊ ရွက်ဖုံးခြောက်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၇-၁၀) ဂရမ်	ကြိုတင်ကာကွယ်၍သော်လည်းကောင်း ရောဂါလက္ခဏာ အစောပိုင်းအဆင့်တွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုရန်
ပဲမျိုးစုံ၊ စပျစ်၊ ဗူး၊ဖရုံ၊သခွား၊ ခရမ်းချဉ်၊ ကြက်သွန်၊ နှင်းဆီ၊ သရက်	ဖားဥမှို၊ မွဲပြောက်စွန်း	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၇-၁၀) ဂရမ်	ကြိုတင်ကာကွယ်၍သော်လည်းကောင်း ရောဂါလက္ခဏာ အစောပိုင်းအဆင့်တွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုရန်
စပျစ်၊ ကြက်သွန်၊ ဗူး၊ဖရုံ၊သခွား	ဒေါင်းနီးရွက်ခြောက်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၇-၁၀) ဂရမ်	ကြိုတင်ကာကွယ်၍သော်လည်းကောင်း ရောဂါလက္ခဏာ အစောပိုင်းအဆင့်တွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုရန်
ငှက်ပျော	စိဂါတိုကာ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၇-၁၀) ဂရမ်	ကြိုတင်ကာကွယ်၍သော်လည်းကောင်း ရောဂါလက္ခဏာ အစောပိုင်းအဆင့်တွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုရန်

Name - Shwe Kayee

a.i - Kresoxim-methyl 50% WG

Product Feature

- It is a broad-spectrum systemic fungicide.
- It has protective, curative, eradicated actions and long residual effects.
- It acts by inhibiting fungal growth, spore production and spore germination.
- Especially it is very effective against powdery mildew.

Advantages

- It induces a "greening effect" by improving photosynthesis efficiency, resulting in better plant vigor and resilience.
- It is effective with a small dose, thus saving costs.
- Since the product has long-lasting effect, there is no need to use frequently.

Uses and Recommendations

Crop	Target pests	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Paddy	Blast, Sheath blight	(7-10) g per (16) L of water	Apply preventively or at the early stage of disease
Legumes, Grapes, Cucurbits, Tomato, Onion, Rose, Mango	Powdery mildew, Anthracnose	(7-10) g per (16) L of water	Apply preventively or at the early stage of disease
Grapes, Onion, Cucurbits	Downy mildew	(7-10) g per (16) L of water	Apply preventively or at the early stage of disease
Banana	Black Sigatoka	(7-10) g per (16) L of water	Apply preventively or at the early stage of disease