

ဆေးအမည် - ရွှေဟိုင်းမက်

အစွမ်းရှိပစ္စည်း(a.i) - Hymexazol 30% SL

ဆေးအာနိသင်

- ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိပြီး မြေဆောင်နှင့် မျိုးစေ့ဆောင် မှိုရောဂါများကို ကာကွယ်နှိမ်နင်းပေးနိုင်သောဆေးဖြစ်သည်။
- ဆေးဖျန်းလိုက်သည်နှင့် အမြစ်မှ အလျင်အမြန်စုပ်ယူပြီး အမြစ်နှင့် ပင်စည်အောက်ခြေသာ ဆေးပျံ့နှံ့နိုင်ပါသည်။
- ဆေးသည် ကောင်းကောင်းကာကွယ်နိုင်သည့် အာနိသင်ရှိပြီး သီးနှံပင်ကြီးထွားစေရန်အတွက်ပါ အားပေးပါသည်။
- အမြစ်ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ ထွက်ရှိမှုကို အားပေးလှုံ့ဆော်ပေးခြင်းအားဖြင့် သီးနှံပင် အပင်ပေါက်နိုင်စွမ်းကို ကောင်းမွန်စေပါသည်။
- မှိုမျှင်ကြီးထွားမှုနှင့် မှိုမျိုးစေ့မျိုးညှောင့်ပေါက်မှုကို ဟန့်တားပေးနိုင်ပါသည်။
- အခြားဆေးများနှင့်လည်းတွဲသုံးနိုင်ပြီး မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- ဆေးသည် အပင်ကြီးထွားဟော်မုန်းဆေးနှင့်တွဲသုံးပါက ပိုမိုအာနိသင်ကောင်းပြီး အအေးဒဏ်၊ ရေလွှမ်းဒဏ်နှင့် အချို့ပေါင်းသတ်ဆေးလောင်မှုကိုလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိစေပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

- မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေးအနေဖြင့် အသုံးပြုပါက ရောဂါများကို ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ အပင်ပေါက်မှုကို အားပေးလှုံ့ဆော်ပေးခြင်းအားဖြင့် အပင်ပေါက်ရာခိုင်နှုန်းကို ကောင်းမွန်စေပါသည်။
- အပင်၏ ရောဂါပိုးမွှားဒဏ်၊ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို တိုးစေပါသည်။

သတိပြုရန်

- ဆေးအား အပင်အမြစ်မှ စုပ်ယူပြီး အမြစ်နှင့် ပင်စည်အောက်ခြေတွင်သာ ပျံ့နှံ့နိုင်သည့်အတွက် အပင်အောက်ခြေသို့ နှံ့နှံ့စပ်စပ် ဖျန်းပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သည့်ရောဂါများ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
ပဲမျိုးစုံ၊ ဝါ	ခါးရို၊ ဖျူးစေရီယမ်ပင်ညှိုး၊ အမြစ်ပုပ်အရွက်ခြောက်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၂၀-၄၀) စီစီ	မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုရန် (သို့) အပင်ငယ်စဉ် သို့ရောဂါလက္ခဏာအစပြုချိန်တွင် အသုံးပြုရန်
ဆီထွက်သီးနှံများ၊ သစ်သီးပင်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ၊ အလှစိုက်ပန်းပင်များ	ခါးရို၊ ပင်သေပင်ပျောက်၊ ဖျူးစေရီယမ်ပင်ညှိုး၊ ပင်စည်ပုပ်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၂၀-၄၀) စီစီ	မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုရန် (သို့) အပင်ငယ်စဉ် သို့ရောဂါလက္ခဏာအစပြုချိန်တွင် အသုံးပြုရန်

Name - Shwe Hymex

a.i - Hymexazol 30% SL

Product Feature

- It is a systemic fungicide for control of soil-borne diseases.
- It is readily absorbed by plant roots and primarily moves locally within the root zone and lower stems.
- It has strong protective with plant growth promoting properties.
- It also works for good seedling by promoting root growth.
- It inhibits fungal growth and spore germination.
- It can not only be used with other pesticides but also as a seed treatment.
- If it is used with PGRs, plant will improve the resistant to cold, flood and phytotoxic effects of some herbicides.

Advantages

- When used as a seed treatment, it enhances germination rates by protecting seeds from fungal pathogens and promoting healthier seedling emergence.
- It enhances plant resistance to pathogens by stimulating the plant's natural defense systems.

Precaution

- Since it is absorbed by the roots and acts locally systemic when sprayed, it is necessary to thoroughly spray at the base of the plant.

Uses and Recommendations

Crop	Target pests	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Legumes, Cotton	Damping off, Fusarium wilt, Root rot and Leaf blight	(20-40) cc per (16) L of water	Apply as a seed-treatment or at the seedling stage of crop or at the initial stage of the disease
Oil-seed crops, Fruit, vegetables, ornamentals	Damping off, Seedling blight, Fusarium Wilt, Stem rot	(20-40) cc per (16) L of water	Apply as a seed-treatment or at the seedling stage of crop or at the initial stage of the disease