

ဆေးအမည်

- ရွှေအင်ဒို

အစွမ်းရှိပစ္စည်း(a.i)

- Indoxacarb 15% SC

ဆေးအာနိသင်

- ဖျက်ပိုး၏ အာရုံကြောဆဲလ်အတွင်းရှိ ဆိုဒီယမ်ချန်နယ်ကို ပိတ်ဆို့တားဆီးပေးခြင်းအားဖြင့် အာရုံကြောလုပ်ဆောင်မှုများကို နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးပေးပါသည်။
- ဖျက်ပိုး၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း အဆိပ်ပုံစံပြောင်းလဲပေးနိုင်သော စွမ်းအားမြှင့်ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်သည်။
- ထိသေနှင့် စားသေအာနိသင်ရှိပြီး (၄) နာရီအတွင်း ဖျက်ပိုး၏စားသောက်ဖျက်ဆီးမှုကို ရပ်တန့်ပေးပြီး (၃) ရက်အတွင်း မူမမှန်ဖြစ်ကာ သေစေပါသည်။
- အခြားအုပ်စုဝင်ပိုးသတ်ဆေးများနှင့်လည်း ရောစပ်အသုံးပြုပါက အာနိသင်ပိုမို အစွမ်းထက်စေသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

- (၁) ကြိမ်အသုံးပြုရုံဖြင့် အာနိသင်ကြာရှည်ခံပြီး ဖျက်ပိုးများကို အချိန်ကြာ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
- အပူချိန်ပြင်းခြင်းနှင့် မိုးရွာသည့်ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သည့်ဖျက်ပိုးများ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
စပါး	စပါးကျောက်ဆူးပိုး/လောင်မီးပိုး၊ ရွက်လိပ်ရွက်ကပ်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) စီစီ	အကောင်ငယ် /လောက်ကောင်ငယ်အဆင့်တွင် (သို့) ဖျက်ဆီးမှုလက္ခဏာ စတင်တွေ့ရှိချိန်တွင် အသုံးပြုရန်
ပြောင်း၊ ဝါ	ဖောငမြောင်တောင်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) စီစီ	အကောင်ငယ် /လောက်ကောင်ငယ်အဆင့်တွင် (သို့) ဖျက်ဆီးမှုလက္ခဏာ စတင်တွေ့ရှိချိန်တွင် အသုံးပြုရန်
မြေပဲ၊ ပဲပုပ်၊ ကုလားပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲ	သီးလုံးဖောက်ပိုး၊ ဆေးရွက်ကြီးခုကောင်၊ ခူမွေးရှည်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) စီစီ	အကောင်ငယ် /လောက်ကောင်ငယ်အဆင့်တွင် (သို့) ဖျက်ဆီးမှုလက္ခဏာ စတင်တွေ့ရှိချိန်တွင် အသုံးပြုရန်
ဟင်းသီးဟင်းရွက်	စိန်ကွက်ဖလံ၊ ဝါသီးလုံးဖောက်ပိုး၊ ခရမ်းချဉ်သီးလုံးဖောက်ပိုး၊ ရွက်ထွင်းပိုး၊ ဆေးရွက်ကြီးခုကောင်၊ ခရမ်းခေါင်ညွန့်ထိုးပိုး၊ လှေး	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) စီစီ	အကောင်ငယ် /လောက်ကောင်ငယ်အဆင့်တွင် (သို့) ဖျက်ဆီးမှုလက္ခဏာ စတင်တွေ့ရှိချိန်တွင် အသုံးပြုရန်

Name - Shwe Indo

a.i - Indoxacarb 15% SC

Product Feature

- It acts as a voltage-gated sodium channel blocker, disrupting nerve signal transmission in insect nerve cells, resulting in paralysis and eventual death.
- As a pro-insecticide, it requires metabolic activation within the insect to convert into its toxic form.
- Exhibiting both contact and stomach action, it causes insects to cease feeding within (0-4) hours, followed by paralysis and mortality within (3) days.
- When used in combination with other insecticide groups, it enhances efficacy and improves resistance management.

Advantages

- A single application ensures long-lasting pest protection, minimizing the need for frequent treatments.
- It exhibits high stability under extreme temperatures and rainfall, ensuring consistent effectiveness.

Uses and Recommendations

Crop	Target pests	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Paddy	Rice hispa, Rice leaf folder	(10-20) cc per (16) L of water	Apply at the young larval stage or onset of damage symptom
Maize, Cotton	Fall armyworm	(10-20) cc per (16) L of water	Apply at the young larval stage or onset of damage symptom
Peanut, Soybean, Chickpea, Pigeon pea, Mungbean, Blackgram	Gram pod borer, Tobacco caterpillar, Hairy Caterpillar	(10-20) cc per (16) L of water	Apply at the young larval stage or onset of damage symptom
Vegetables	Diamondback moth, Cotton bollworm, Tomato fruit borer, Tomato leaf miner, Tobacco caterpillar, Fruit & shoot borer, Thrip	(10-20) cc per (16) L of water	Apply at the young larval stage or onset of damage symptom