

မြင်းကျားနှစ်းအထူး

အာနိသင်

- အချိန်မီ ပက်ဖျိန်းပေးခြင်းဖြင့် အပင်အရပ်ညီညာစေခြင်း။
- မိုးခေါင်ချိန်ကြံးပါက ရေတ်ဒဏ် အတော်အသင့် ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း။
- အပင်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အတူ အမြစ်ဖွဲ့စည်းမှု ခိုင်မာစေခြင်း။
- ကိုင်းယျာမျိုးများ ကိုင်းထွက်ကောင်းခြင်း။
- သီးတောင့်ပတ်လည် ဆစ်ကြားများ လွတ်ကင်းစွာ သီးခြင်း။
- အစွေးအဆုံးအောင်မြင်ခြင်း၊ သီးတောင့်များ အချိန်မီ ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားစေခြင်း။
- ပိုးမွားရောဂါဒဏ် ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း။

သတိပြုရန်

- ပိုးသတ်ဆေး၊ မိုးသတ်ဆေးများနှင့် ရောစပ်ပက်ဖျိန်းနိုင်ပါသည်။
- နံနက်ခင်းစောစောနှင့် ညာနေခင်းနောက်ချိန် ပက်ဖျိန်းပေးပါက ပို့မို့ထိရောက်သည်။

သုံးခွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုချိန်
နှစ်း	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၄၀-၅၀) ဂရမ်	အချက် (၄-၅) ရွက်ထွက်ချိန်မှစ၍ ခေါင်းလောင်းဆွဲပန်းစတင်ပွင့်ချိန်ထိ (၇-၁၀) ရက်ခြား အသုံးပြုရန်

Name - Myin Kyar Sesame

Ingredient - N 25% : P2O5 10% : K2O 10% + 0.789% MgO

Product Feature

- Ensures uniform plant growth with timely application.
- Enhances drought resistance under dry conditions.
- Strengthens both plant architecture and root system development.
- Promotes robust stalk and tiller formation.
- Facilitates optimal fruit setting with minimal gaps.
- Supports successful grain development and timely fruit maturation.
- Enhances resistance to pests and diseases.

Precaution

- Can be combined with insecticides and fungicides for concurrent application.
- For optimal efficacy, apply early in the morning or during the evening at sunset.

Uses and Recommendations

Crop	Dosage	Applicable Time
Sesame	(40-50) g per (16) L of water	To apply starting from (4-5) leaf stage, continuing every (7-10) days until the onset of flowering