

မြင်းကျားကွမ်းအထူး

အာနိသင်

- ကွမ်းပင်၏ အစာချက်လုပ်အားကို ပိုကောင်းစေသဖြင့် အရွက်အရွယ်အစားကြီးခြင်း။
- ကွမ်းပင်များ ပင်စည်တုတ်ခိုင်းပြီး ခေါင်ညွန့်၊ ခါးညွန့် (စလင်းတက်) များကို သန်မာစေခြင်း။
- အဆစ်တိုင်းမှ ထွက်လာသော အရွက်များ အရွက်ပြန့်ကားပြီး အရွက်အရောင်ပိုလှပစေခြင်း။
- အရွက် အလေးချိန်စီးပြီး အရည်အသွေး ပိုကောင်းစေခြင်း။
- ကွမ်းပင်၏ မြေအောက်မြစ်နှင့် မြေပေါ်ပိုင်းပင်စည်အမြစ်ထွက်အားကို ပိုကောင်းစေသဖြင့် ရေနဲ့ အစာအာဟာရစုပ်ယူမှုကို ကောင်းစေခြင်း။
- ပတ်ဝန်းကျင် ရာသီဥတုဒဏ်၊ ရောဂါနှင့် ပိုးမွှားဒဏ်ခံနိုင်ရည် ပိုရှိစေခြင်း။

သတိပြုရန်

- နံနက်ပိုင်းနှင့် ညနေပိုင်းတွင် အသုံးပြုရန်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
ကွမ်းရွက်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၅၀) ဂရမ်	မျိုးအဖြစ်သုံးမည့် ကွမ်းအညွန့်များ၊ စိုက်ပြီးစကွမ်းပင်ငယ်များ၊ အရွက်ခူးနေသော ကွမ်းပင်ကြီးများအားလုံးတွင်(၇-၁၀) ရက်ခြား (၁) ကြိမ် ဖျန်းရန်

Name - Myin Kyar Betel

Ingredient - N 15% : P2O 4% : K2O 15% : MgO 3% : S 10% : Fe 370 ppm, Mn 160 ppm, Zn 800 ppm, Cu 30 ppm, B 180 ppm, Ca 800 ppm

Product Feature

- Improves the photosynthetic efficiency of the betel vine, leading to larger, healthier leaves.
- Enhances the strength and rigidity of the stems, shoots, and branches.
- Promotes uniform leaf growth from every node, resulting in a more expansive canopy with improved leaf coloration.
- Increases leaf weight, thereby enhancing overall leaf quality.

- Optimizes fibrous root and climbing root development, improving the plant's ability to absorb water and nutrients efficiently.
- Strengthens the plant's resistance to environmental stresses, including adverse weather, diseases, and pest damage.

Precaution

- Apply the spray during the early morning or late evening, when temperatures are cooler.

Uses and Recommendations

Crop		Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Betel vine		(50) g per (16) L of water	To be applied once every (7-10) days on betel vine cuttings for propagation, young plants, and mature vines