

မက်ဂါ မြေပဲအထူး

အာနိသင်

- မြေပဲ အပင်ပြန့်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးခြင်း၊ အပင်အကိုင်းအခက် ဖွဲ့စည်းမှုကောင်းခြင်း။
- အရွက်၏ အစာချက်နှုန်း ကောင်းမွန်သဖြင့် စွယ်ချအား (စွယ်ဆင်းနှုန်း) အထူးကောင်းမွန်ခြင်း။
- ဥဆင်းစွယ်တိုင်း ဥဥမှု (အသီးတင်မှု) များပြားခြင်း၊ မြေပဲတောင့်တိုင်း အစေ့အဆန် ပြည့်ဝအောင်မြင်ခြင်း။
- အစေ့အဆံ အလေးချိန်ပြည့်ဝပြီး သီးတောင့်ကြီးထွားခြင်း၊ အထွက်တိုးခြင်း၊ သီးညှာခိုင်ခြင်း။
- ပိုးမွှားရောဂါဒဏ်ခံနိုင်ရည်တိုးတက်လာခြင်း။
- မိုးခေါင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ဥစွယ်ဆင်းမှု ထူးခြားများပြားစေခြင်း။

သတိပြုရန်

- ပေါင်းဆော်ပွင့် မပွင့်ခင် မပက်ဖျန်းရပါ။ အပင်ပေါ်တွင်သာမက အပင်ခြေရင်း အမြစ်စုံပေါ် ရွဲရွဲစိုအောင် ပက်ဖျန်းပေးပါ။
- အခြားမှိုသတ်ဆေး၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ အားဆေးများဖြင့် ရောစပ်မဖျန်းရပါ။ အာနိသင်ပိုကောင်းစေရန် ဤဆေးကို သီးခြားဖျန်းပါ။
- နံနက်ခင်းစောစောနှင့် ညနေခင်းနေအေးချိန် ပက်ဖျန်းပေးပါက ပိုမိုထိရောက်မှု ရှိပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှုန်းထား	အသုံးပြုချိန်
မြေပဲ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၄၀-၅၀) စီစီ	ပထမအကြိမ် - ပေါင်းဆော်ပွင့် စပွင့်ချိန် (၃၀-၄၀) ရက်သား ဒုတိယအကြိမ် - စွယ်များများချစေရန် စွယ်ချခါနီး ပန်းစုံစုံပွင့်ချိန်မတိုင်မီ တတိယအကြိမ် - သီးတောင့်များပြီး အစေ့အဆံပိုအောင်စေရန် စွယ်ချစုံပြီးနောက် (သို့) ပန်းစုံစုံပွင့်ပြီးနောက် (၁၀-၁၅) ရက်ခန့်

Name - Mega Peanut

Ingredient - Ca 1000 ppm, Mg 2900 ppm, S 2200 ppm, Fe 200 ppm, Cu 30 ppm, Zn 700 ppm, Mo 180 ppm

Product Feature

- Regulates peanut plant growth to optimize structure and minimize excessive spreading.
- Enhances photosynthetic efficiency, promoting superior peg production rate and seed development.
- Maximizes pod formation per peg and ensures high seed quality within each pod.
- Improves seed weight, pod size, and overall yield while enhancing pod firmness.
- Strengthens resistance to pests and diseases.
- Increases drought tolerance and significantly enhances peg and pod development.

Precaution

- Avoid spraying before the flowering stage. Ensure thorough application, covering both the plant and the root zone for optimal absorption.
- Do not mix with other fungicides, pesticides, or fertilizers. To maximize effectiveness, apply this treatment separately.
- For optimal results, spray during the early morning or late evening when temperatures are cooler.

Uses and Recommendations

Crop	Dosage	Applicable Time
Peanut	(40-50) cc per (16) L of water	1st time – At (30-40) days after sowing 2nd time – To maximize peg production, before the full flowering stage approaches 3rd time – To improve grain filling and yield, about (10-15) days after full peg production or full flowering