

## မက်ဂါမီလျှံကေ

### အာနိသင်

- ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်အများဆုံးပါဝင်ပြီး အခြားအာဟာရဓာတ်များဖြင့် အချိုးကျပောင်းစပ်ထားသည့်အတွက် သီးနှံများ အသီးအပွင့်များ ဝေဝေဆာဆာသီးပွင့်စေနိုင်ခြင်း။
- အစာချက်လုပ်မှုအားကောင်းစေပြီး သီးနှံပင်၏ ပရီတင်းဓာတ်နှင့် အမိုင်နှီးအက်စစ်များ ဖြစ်ပေါ်ခြောင်း။
- အပင်၏ ရေရှိအပ်မှုကို ထိန်းချုပ်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး သီးနှံပင်၏ ရေငတ်ဒဏ်နှင့် အငန်ဓာတ်လွန်ကဲမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်စွမ်းအား တိုးစေခြင်း။
- ရောဂါများစွာကို ကျော်လွှားတိုက်ခိုက်ဖြေရှင်းပေးပြီး ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေခြင်း။
- သီးနှံ၏ အရောင်နှင့်အရသာကောင်းခြင်း။
- ဆစ်ကြားတို့မှုမရှိခြင်းနှင့် အသီးဥများအောင်မြင်စွာ ကြီးထွားဖြစ်ထွန်းခြင်း။
- သီးနှံပင်များပေါ်တွင် (၂၁) ရက်အထိ တာရည်ခံပြီး အာဟာရဓာတ် အပြည့်အဝပေးနိုင်ခြင်း။

### သတိပြုရန်

- ဇင့်ဓာတ်ချို့တဲ့သော သီးနှံပင်များအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
- အခြားပိုးသတ်ဆေး၊ မြို့သတ်ဆေး၊ ဟော်မှန်းဆေးများ၊ အခြားဓာတ်မြေသာတို့နှင့် ရောစပ်၍ ပက်ဖျော်ခြင်းဖြင့် အာနိသင် ပိုမိုလျင်မြန်ထိရောက်စေသည်။

### သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း / အသုံးပြုချိန်
စပါး၊ ဝါ၊ ကြက်သွန်နှီး၊ ကြက်သွန်ဖြူး၊ ပလျိုးစုံ၊ ဖရဲ့၊ သခြား၊ ဟင်းသီးဟင်းချွက်၊ သစ်သီးဝလံများ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၄၀-၅၀) ကရမဲ	အပင်ငယ်ချိန်၊ အဖူးအပွင့်ဝင်ချိန်နှင့် အသီးကြီးထွားချိန်တွင် အသုံးပြုရန်

**Name** - Mega Million K

**Ingredient** - K<sub>2</sub>O 34 % : P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 13 % : Zn 12.5 % : N 7 % : MgO 2 % : Zn 114 ppm, Fe EDTA 438 ppm, Mn EDTM 133 ppm, Cu EDTA 49 ppm, B soluble 340 ppm, Mo soluble 97 ppm

### **Product Feature**

- High potassium content, expertly balanced with essential nutrients to support optimal fruit and flower development in crops.
- Enhances metabolic efficiency, promoting the synthesis of proteins and amino acids for robust plant growth.
- Optimizes drought tolerance and salt stress resistance in crops.
- Strengthens plant immunity, enabling resilience against diseases and environmental fluctuations.
- Improves fruit quality, enhancing color, taste, and overall market value.
- Prevents short internodes and ensures uniform growth and development of fruits and tubers.
- Provides sustained nutrient release for up to 21 days, ensuring long-lasting nourishment for plants.

### **Precaution**

- Highly effective for crops experiencing zinc deficiency.
- Compatible with insecticides, fungicides, plant growth regulators, and fertilizers, ensuring enhanced efficiency and rapid absorption when applied together.

### **Uses and Recommendations**

<b>Crop</b>	<b>Dosage</b>	<b>Applicable Method/ Applicable Time</b>
Paddy, Cotton, Onion & Garlic, Legumes, Watermelon, Cucumber, Vegetables, Fruits	(40-50) g per (16) L of water	To be used during the early growth stage, flowering stage, and fruit development stage.