

ပါဝါဟူးမစ်

အာနိသင်

- စိုက်ပျိုးမြေဆီလွှာဖွဲ့စည်းမှုကို ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း။
- မြေဆီလွှာရှိ အကျိုးပြုအဏုဇီဝသက်ရှိများ ပေါများစေခြင်း။
- သီးနှံပင်၏ အမြစ်များ သန်မာပြီးအောက်သို့ အမြစ်များများဆင်းနိုင်စေခြင်း။
- ရာသီဥတုပူပြင်းခြင်းဒဏ်နှင့် ရေငတ်ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေခြင်း။
- မြေဆီလွှာ၏ မြေချဉ်ဇာတ်ကို ထိန်းပေးခြင်း။
- သီးနှံပင်မှလိုအပ်သော အာဟာရဓာတ်များကို မြေကြီးထဲမှ လျင်မြန်စွာနှင့် အလွယ်တကူ စားသုံးနိုင်စေရန် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း။
- အစာချက်လုပ်မှု အားကောင်းစေပြီး သီးနှံပင်ကြီးထွားမှု မြန်ဆန်စေခြင်း။
- သီးနှံစုံတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး အထွက်နှုန်းတိုးစေခြင်း။
- အခြားသောရွက်ဖျန်းအားဆေးများနှင့်လည်းရောစပ်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။

သတိပြုရန်

- သန့်ရှင်းပြီး ခြောက်သွေ့သော နေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။
- နေရောင်ခြည်နှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သော နေရာတွင် မထားရပါ။
- သီးနှံပင်၏ သက်တမ်းပေါ်မူတည်ပြီး (၇-၁၀) ရက်ခြား (၃-၄) ကြိမ်အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
နှံစားသီးနှံများ၊ ဆီထွက်သီးနှံများ၊ ပဲမျိုးစုံ၊ စက်မှုသီးနှံများ၊ နှစ်ရှည်သီးနှံများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးဝလံများ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) ဂရမ်	သီးနှံပင်(၂၀) ရက်သားမှစတင်ပြီး အဖူးအပွင့်ဝင်ချိန်အထိ အသုံးပြုရန်

Name - POWER Humic

Ingredient - Humic acid (HA) 55%

Product Feature

- Enhancing agricultural soil structure to promote optimal crop growth.
- Boosting the population of beneficial microorganisms within the soil.
- Strengthening crop roots, enabling deeper penetration into the soil.
- Increasing resilience of crops to high temperatures and drought conditions.
- Regulating soil pH levels for improved crop performance.
- Facilitating rapid and efficient absorption of essential nutrients by crops from the soil.
- Promoting efficient metabolic processes, resulting in accelerated crop growth.
- Increasing overall yield and productivity across various crops.
- Compatible with other pesticide formulations for integrated use.

Precaution

- Store in a clean, dry place.
- Do not store in areas exposed to direct sunlight.
- Can be used up to (3-4) times, with intervals of (7-10) days, depending on the lifespan of the crop.

Uses and Recommendations

Crop	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Cereal crops, Oil-seed crops, Legumes, Industrial crops, Perennial crops, Vegetables, Fruits	(10-20) g per (16) L of water	Begin use starting from 20 days after sowing until the flowering stage