

မက်ဂါဂျီအသရီး

အာနိသင်

- စပျစ်၊ ခရမ်းချဉ်ကဲ့သို့သော သီးနှံများတွင် သီးခိုက်ထွက်မှုများခြင်း၊ သီးခိုက်ရှည်ထွက်ခြင်း။
- ဂန္ဓမာကဲ့သို့သော ပန်းပင်များ ဖူးတံရှည်ထွက်မှု မြန်စေခြင်း။
- စပါးပင်များ အပင်အရပ်ညီညာ၍ အနှံထွက် ဂုတ်လွတ်မြန်စေခြင်း။
- ရှောက်သံပုရာ၊ သရက်ကဲ့သို့သော သီးပင်များ ရင့်မှည့်မှုကို ထိန်းထားနိုင်ခြင်း။
- ရာသီဥတုအေးချိန်တွင် အပင်ငယ်များ ကြီးထွားမှုကို ရပ်တန့်နေခြင်းမှ လွတ်မြောက်စေခြင်း။
- မျိုးစေ့/သစ်ဥသစ်ဖုများ ငုတ်ခြင်း (နားခြင်း) ကို ချေဖျက်ပေးပြီး အပင်ပေါက်နှုန်းကောင်းစေခြင်းနှင့် အပင်ငယ်ကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေခြင်း။
- သီးနှံပင်များ ကြီးထွားမှု ညီညာစေခြင်း၊ အသီးအရွယ်အစားကြီးခြင်း၊ အရောင်အသွေးလှပခြင်းများကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်း။
- အခြားသောရွက်ဖျန်းအားဆေးများနှင့်လည်း တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။

သတိပြုရန်

- အယ်လ်ကာလီပါသော ဆေးများနှင့် တွဲဖက်အသုံးမပြုသင့်ပါ။
- လေငြိမ်သောအခြေအနေတွင် အသုံးပြုရန်။
- အေး၍ခြောက်သွေ့ပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင် အသုံးပြုရန်။
- အလွန်အမင်းကြီးထွားနိုင်သဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
စပါး	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀) ဂရမ် ဆေးပြား (၁) ပြား၏ (၄) ပုံ (၁) ပုံ	မျိုးစေ့တိုက်ရိုက်ချစိုက်ခင်းတွင် ကြွဲပြီး (၂၅-၃၅) ရက်သား (သို့) ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီး (၁၅-၂၀) ရက်သား
အာလူး	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀) ဂရမ် ဆေးပြား (၁) ပြား၏ (၄) ပုံ (၁) ပုံ	မျိုးစေ့ပုပ်ခြင်းကို ကျော်လွှားနိုင်စေရန် မစိုက်မီ မိနစ် (၃၀) တွင် စိမ်ရန်။
စပျစ်	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀) ဂရမ် ဆေးပြား (၁) ပြား၏ (၄) ပုံ (၁) ပုံ	ပန်းပွင့်ချိန်နှင့် သီးကင်းဝင်ချိန်

Mega GA3

Product Feature

- Promotes uniform fruit setting and elongation in crops like grapes and tomatoes.
- Enhances the rapid elongation of flower stalks in ornamental plants such as chrysanthemum.
- Ensures uniform growth and accelerates panicle initiation and emergence in rice crops.
- Regulates and controls the ripening process in fruit crop such as citrus, mango.
- Helps overcome growth retardation in young plants during cold weather conditions.
- Effectively breaks dormancy in seeds, tuber, and buds, enhancing germination rates and promoting vigorous seedling growth.
- Encourages uniform plant growth, improves fruit size, and enhances color and appearance.
- Can be safely combined and used with other foliar fertilizers.

Precaution

- Do not mix with strong alkaline substances or incompatible agrochemicals unless confirmed safe.
- Apply during calm weather conditions to prevent drift to non-target crops.
- Store in a cool, dry, well-ventilated area, away from direct sunlight and moisture.
- Avoid over-application to prevent undesirable growth effects.

Uses and Recommendations

Crop	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Paddy	¼ of the (10) g tablet per (16) L of water	At (25-35) days after sowing in direct-seeded field/ (15-20) days after transplanting
Potato	¼ of the (10) g tablet per (16) L of water	Soak the seeds for 30 min before planting to break dormancy and promote sprouting
Grapes	¼ of the (10) g tablet per (16) L of water	At flowering stage and fruit setting stage