

## မက်ဂါစူပါတောနစ်

### အာနိသင်

- မျိုးစေ့အပင်ပေါက်နှုန်း ကောင်းစေခြင်းနှင့် အပင်ပေါက်၊ ကိုင်းဖြတ်ပင်များ မြစ်ထွက်နှုန်းကို ကောင်းစေခြင်း။
- သီးနှံပင်များ၏ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးခြင်း။
- သီးနှံပင်များ၏ အပွင့်၊ သီးကင်းကြွေကျမှု လျော့နည်းစေပြီး စောစောရင့်မှည့်စေခြင်း။
- သီးနှံအထွက်နှုန်းကို သာမက သီးနှံ၏ အရွယ်အစား၊ အရောင်၊ အရသာကို ကောင်းစေပြီး တာရှည်အထားခံစေခြင်း။
- အသုံးပြုပြီးအချိန်တိုအတွင်း အာနိသင်ပြနိုင်ခြင်း။

### သတိပြုရန်

- သီးနှံပင်ဆေးလောင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်နှင့် အာနိသင်ထိရောက်မှုရှိစေရန် နံနက်ခင်းစောစောနှင့် ညနေနေအေးချိန်တွင် အသုံးပြုရန်။
- လေတိုက်သောချိန်နှင့် မိုးရွာသောအချိန်များတွင် အသုံးမပြုရန်။
- အေး၍ ခြောက်သွေ့သော၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင် သိုလှောင်သိမ်းဆည်းရန်။

### သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	ဆေးနှုန်းထား	အသုံးပြုနည်းလမ်း/ အသုံးပြုချိန်
စပါး၊ ပြောင်း၊ ဆီထွက်သီးနှံ၊ ပဲမျိုးစုံ၊ အာလူး၊ ဖရဲ၊ သခွားမွေး၊ ကွမ်း၊ ရှောက်၊ သံပရာ၊ လိမ္မော်၊ စပျစ်၊ ပန်းသီး၊ ပန်းမုန်လာ၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ မုန်ညင်း၊ အလှစိုက်ပန်းပင်များ	ရေ (၁၆) လီတာလျှင် (၁၀-၂၀) စီစီ	ပင်ပိုင်းကြီးထွားချိန်၊ ပန်းပွင့်ချိန်နှင့် အသီးဝင်ချိန်တွင် အသုံးပြုရန်
နှံစားသီးနှံများ၊ ဆီထွက်သီးနှံများ၊ ပဲမျိုးစုံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ	ရေ (၈) လီတာလျှင် (၅) စီစီ	ရေ (၂) လီတာခန့်နှင့် ဆေးကို ပလပ်စတစ် (သို့) စတီးပုံးထဲသို့ထည့်ပါ။ ရောစပ်ပြီးဆေးရည်တွင် မျိုးစေ့များကို (၁၂) နာရီကြာစိမ်ပြီး ပျိုးထောင်စိုက်ပျိုးရန်

## Mega Super Tonic

### Product Feature

- Effectively stimulates seed germination and encourages strong root formation in seedlings and cuttings, ensuring healthy early-stage growth.
- Supports robust vegetative growth and overall plant development, leading to healthier and more resilient crops.
- Minimizes premature shedding of flowers and fruits, contributing to improved fruit set and yield stability.
- Encourages early flowering and fruit ripening, allowing for timely harvest and better marketability.
- Delivers higher crop yields with enhanced quality attributes such as size, color, taste, and shelf-life.
- Quick absorption and fast response visible within a short period post-application.

### Precaution

- Apply during cooler parts of the day (early morning or late afternoon) to avoid leaf scorch and maximize effectiveness.
- Do not apply during windy conditions or when rain is expected shortly after application, to prevent drift and wash-off.
- Store in a cool, dry, and well-ventilated area, away from direct sunlight, food, animal feed, and out of reach of children and pets.

### Uses and Recommendations

Crop	Dosage	Applicable Method/ Applicable Time
Paddy, Maize, Oil-seed crops, Legumes, Potato, Watermelon, Muskmelon, Betel vine, Lime, Citrus, Orange, Grapes, Apple, Cauliflower, Cabbage, Mustard, Ornamentals	(10-20) cc per (16) L of water	At vegetative stage, flowering stage and fruit setting stage
Cereal crops, Oil-seed crops, Legumes, Vegetables	(5) cc per (8) L of water	Dissolve the required quantity of the product in approximately 2 liters of water using a plastic or stainless steel container. Stir well to ensure complete mixing. Soak the seeds in the prepared solution for 12 hours prior to sowing or transplanting.